

سيبيقولد

مبيد حشري

أقوى وأنجع وأرفق



ضد:
ذبابة الزيتون
سيراتيت
بسيل
نيرون
الزيلي
سيكادال
الذبابة البيضاء
كربوكابس
عثة الزيتون
تريبس

CYPGOLD

Insecticide

Plus concentré

Plus efficace

Plus économique



CYPGOLD®

Le Secret Des Agriculteurs Malins

Emballages Disponibles :




Composition : 500g/L Cyperméthrine
 Famille chimique : Pyréthriinoïde
 Formulation : Concentré emulsionnable (EC)
 Mode d'action : Modulation de l'activité des canaux sodiques
 Méthode d'application : Application foliaire et goutte à goutte
 Numéro d'homologation : I.029-22



CYPGOLD® La Puissance à Chaque Goutte

Mode d'action du **Cypgold®** au niveau de la cellule nerveuse



✓ **Cypgold®** agit par contact et ingestion sur un large spectre d'insectes.

✓ **Cypgold®** se caractérise par un effet répulsif, anti-appétant et anti-ponte.

✓ **Cypgold®** possède une longue persistance d'action (2 à 3 semaines).

✓ **Cypgold®** est doté d'un puissant effet de choc.

CYPGOLD®

Un Très Large Spectre à Faibles Doses

Culture	Ravageurs	Dose	Période d'application et recommandations	DAR (jours)
olivier زيتون	teigne de l'olivier حافرة أوراق الزيتون Dacus ذبابة الزيتون	10 mL/hL équivalent à 100 mL/Ha 10 مل/هكتولتر ما يعادل 100 مل/هكتار 7.5 mL/hL équivalent à 75 mL/Ha 7.5 مل/هكتولتر ما يعادل 75 مل/هكتار	Déclencher le traitement lorsque 5% d'inflorescences sont attaquées pour la génération anthophage et de 20% d'olives sont infestées pour la génération carpophage Déclencher le traitement une fois le seuil de 7 mouches/jour/piège est atteint pour les variétés d'olivier à huile et 1 mouche/piège/jour pour les variétés à table	28
Vigne عنب	Cicadelle, tordeuse, ver de la grappe سبكاڤال، جوده القواكه	6 mL/hL équivalent à 60 mL/Ha 6 مل/هكتولتر ما يعادل 60 مل/هكتار	 Effectuer des applications foliaires dès que le seuil de nuisance est atteint	21
Maraîchage خضروات	Noctuelles, Puceron, Mouche blanche الديدان الليلية، الزبلي، الذبابة البيضاء	10 mL/hL équivalent à 100 mL/Ha 10 مل/هكتولتر ما يعادل 100 مل/هكتار	 Effectuer des applications foliaires dès que le seuil de nuisance est atteint	3
Cucurbitacées قرعيات	Pucerons الزبلي	7.5 mL/hL équivalent à 75 mL/Ha 7.5 مل/هكتولتر ما يعادل 75 مل/هكتار	 Déclencher le traitement lorsque 10% des feuilles sont colonisées par l'insecte	3
Agrumes قوارص	Cératite سيراتيت	7.5 mL/hL équivalent à 75 mL/Ha 7.5 مل/هكتولتر ما يعادل 75 مل/هكتار	 Déclencher le traitement une fois le seuil de 3 mouches/ piège / jour est atteint	15
Pêcher خوخ	Cicadelle, cératite, puceron سبكاڤال، سيراتيت، زبلي	5 mL/hL équivalent à 50 mL/Ha 5 مل/هكتولتر ما يعادل 50 مل/هكتار	 Effectuer des applications foliaires dès que le seuil de nuisance est atteint	15
Pommier تفاح	carpocapse كربوكايس	7.5 mL/hL équivalent à 75 mL/Ha 7.5 مل/هكتولتر ما يعادل 75 مل/هكتار	 Déclencher le traitement une fois le seuil de 3 papillons/ piège est atteint	14
Grande cultures زراعات كبرى	Altise, sitone ألتييس، سيتون	5 mL/hL équivalent à 50 mL/Ha 5 مل/هكتولتر ما يعادل 50 مل/هكتار	 Effectuer des applications foliaires dès que le seuil de nuisance est atteint	-

Compatibilité

Cypgold® est compatible avec la plupart des pesticides. Cependant éviter les mélanges fortement alcalins et faire un test préalable avant de généraliser le traitement.