

DIVA1.8EW

ديفا[®] 1.8 م.م
مبيد الحشرات

DIVA1.8EW ,les atouts

- Une nouvelle formulation EW
- Un mode d'action unique en son genre (multi-sites)
- Une action translaminaire garantissant une bonne persistance d'action
- Un excellent outil pour briser la résistance des ravageurs aux pesticides
- Un profil toxicologique et écotoxicologique favorable

DIVA1.8EW , la nouvelle formulation (EW)

DIVA se différencie par sa formulation émulsion aqueuse (EW) par rapport aux autres spécialités contenant de l'abamectine sous forme d'émulsion concentré (EC). Cette nouvelle formulation offre:

- Une meilleure absorption du produit par les feuilles
- Une action translaminaire plus rapide
- Très peu de solvants dans la formulation
- Une réduction du niveau de phytotoxicité
- Une meilleure sécurité pour le stockage et le transport du produit
- Un profil plus respectueux de l'environnement

DIVA1.8EW , mode d'action

Diva agit par ingestion, et par contact, avec une systémie limitée. Après ingestion, l'abamectine migre jusqu'à la jonction neuro- musculaire chez l'insecte où cohabitent les récepteurs glutamate-H et GABA. L'abamectine se lie indifféremment sur ces deux sites, ce qui entraîne la paralysie rapide des acariens.

DIVA1.8EW Action translaminariere prolongée

- DIVA pénètre rapidement dans les tissus végétaux après pulvérisation. Sa localisation dans le parenchyme foliaire protège la substance active des facteurs climatiques (pluie, UV..).
- La feuille joue le rôle d'un réservoir où les ravageurs ingèrent le produit.
- Cette propriété confère au produit une persistance d'action allant de 3 à 6 semaines.

DIVA1.8EW ,Usages et recommandations

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR	Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Agrumes	Acariens des bourgeons, Phytomyces, Tarsonème	60cc/hl	10j	Poivron	Acariens, Mineuses, Thrips	1.2l/ha	03j
Agrumes	Mineuses	40cc + 400cc huile minérale/hl	10j	Tomate	Acariens, Mineuses, Thrips	30cc/hl	03j
Pommier	Acarien rouge (P.ulmi), phytomyces	75cc/hl	21j	Courgette, melon, pastèque	Acariens, Mineuses	0.5l/ha	03j
Poirier	Acarien rouge (P.ulmi), Phytomyces, Psylles	75cc/hl	21j	Fraisier	Acariens tétranyques, tarsonème	0.5l/ha	21j



Diva sur Acariens (larves et adultes): il faut intervenir dès la présence très nette de populations d'acariens (au moins 2 à 5 formes mobiles par feuille) ou l'apparition de symptômes.

En cas de recontamination importante durant l'été, un second traitement peut être justifié

Diva sur Thrips (larves): il faut intervenir dès l'apparition des premiers foyers.

Diva sur Psylles (larves): Dès l'apparition des premiers symptômes d'enroulement des feuilles, de présence de cire cotonneuse ou de miellat. Renouveler 7 jours après si nécessaire

DIVA1.8EW , Un excellent outils pour briser la résistance

- Le double site d'action est très intéressant quant à la gestion des résistances.
- Son profil multi-sites explique la raison pour laquelle les insectes (surtout les acariens) ne développent pas de résistance vis-à-vis de l'abamectine.

DIVA1.8EW Plus respectueux de l'environnement

- Après application, la fraction du produit restante à la surface de la feuille se dégrade rapidement sous l'action de la lumière, ce qui écarte tout risque pour les auxiliaires.
- La quantité très réduite du solvant dans la formulation EW, confère au produit un profil plus respectueux de l'utilisateur et de l'environnement.

ديپا® 1.8 م.م

تعريف المبيد:

ديپا® 1.8 م.م. مبيد حشري عناكبي يحتوي على 18 غ/ل من مادة الأباكتين على شكل مستحلب مائي. يعمل ديپا® 1.8 م.م. بالقضم و بالملامسة على العناكب التي تصيب المحاصيل كما أنه سليم على الحشرات النافعة فيدخل بنجاح ضمن برامج مكافحة المندمجة (IPM).

المقادير ونصائح الاستعمال:

الزراعات	الأفة	الجرعة	الزراعات	الأفة	الجرعة
القوارص	القرديات	60 مل / 100 ل ماء	الفلفل	القرديات , حافة الأوراق , التريس	1.2 ل / هك
القوارص	حافة الأوراق	40 مل + 400 مل زيت	الطماطم	القرديات , حافة الأوراق , التريس	30 مل / 100 ل ماء
التفاح	القرديات	75 مل / 100 ل ماء	القرعيات	القرديات حافة الأوراق	0.5 ل / هك
الاجاص	القرديات والعسيلة	75 مل / 100 ل ماء	الفراولو	القرديات وتارسونام	0.5 ل / هك

ديپا® 1.8 م.م على العناكب: يجب المداواة عند ظهور من 2 الى 5 ديدان على الورقة الواحدة وفي حالة الانتشار الواسع يجب اعادة المداواة

ديپا® 1.8 م.م على التريس: يجب المداواة عند ظهور اولي الاعراض

ديپا® 1.8 م.م على البسيل: المداواة عند بداية انكماش الاوراق او وجود مادة لاصقة (عسيلة) مع اعادة الجرعة بعد 7 أيام ان تطلب الأمر

يجب احترام الجرعة الموصى بها مع الحرص على أن يصل محلول الرش الى كافة أجزاء النبات بصفة متجانسة.

قابلية المزج:

يمكن مزج ديپا® 1.8 م.م. مع معظم الأسمدة الورقية و المبيدات الغير قلووية. ينصح بإجراء اختبار قابلية المزج على مساحة محدودة قبل تعميم المداواة.



المنطقة الصناعية مغيرة 2 مقسم عدد 54
الهاتف: 79 40 89 40 الفاكس: 79 40 88 89

DIVA1.8 EW

ديپا® 1.8 م.م

FMC

DIVA1.8 EW

ABAMECTINE 1.8% EW