MYTHOS®

MYTHOS est un fongicide contenant 300 g/ L de pyrimethanil appartenant à la famille des anilino-pyrimidines.
MYTHOS présente une excellente activité sur Botrytis, Venturia, ainsi que sur d'autres maladies d'importance (Alternaria, Monilinia ...).
MYTHOS ne présente pas de résistance croisée avec les autres familles chimiques et aucun cas de résistance du pathogène n'a été rapporté après une dizaine d'années de présence sur le marché.
MYTHOS possède un excellent profil vis-à-vis des consommateurs et de l'environnement – compatible avec l'IPM.

UN MODE D'ACTION ORIGINAL

MYTHOS® agit par l'inhibition de la secrétions d'enzymes fongiques à différents sites biochimiques, en fonction de l'espèce

MYTHOS® passe au travers de la cuticule, donc agit sur les structures sub-cuticulaires, prévenant l'extension sub-cuticulaire de l'hyphe et la sporulation.

MYTHOS® est reconnu comme étant le produit le plus curatif parmi les anilinopyrimidines

MYTHOS® agit par contact et présente une excellente activité translaminaire ce qui assure une meilleure couverture des organes de la plante

MYTHOS® peut atteindre rapidement le site de l'infection fongique vu sa pénétration rapide, et la mobilité aisée à l'intérieur de la feuille



USAGES ET RECOMMENDATIONS

Cultures	Vigne	Tomate sous serres	Fraisier	Pommier	Pommes (Entreposage)	Oignon, ail	Pomme de terre
Maladies	*Pourriture grise (Botrytis cinerea)*	*Pourriture grise (Botrytis cinerea)*	*Pourriture grise (Botrytis cinerea)*	*Tavelure (Venturia inequalis)*	*Pourriture grise (Botrytis cinerea)* *Penicillium*	*Brûlures des feuilles botrytis squamoza, Botrytis allii)*	*Alternariose (Alternaria solani)*
Dose	250 cc/hl	250 cc/hl	250 cc/hl	100 cc/hl	250 cc/hl	150 cc/hl	100 cc/hl
DAR	7	1	1	72	14	7	7
Symptômes observés							

BAYER

MYTHOS® ميطوس

avec une **PROTECTION**
+ FORTE + RAPIDE + LONGUE
BOTRYTIS** et **TAVELURE
ne sont **PLUS** un **PROBLEME**

EL MOUSSEM Agricole S.A. الموسم الفلاحي ش.خ.ا

Science For A Better Life

ميطوس

حمـــايـة أقوى، أسرع، أطـــول

ميطـوس® مبيد فطري يحتوي على 300غ/ل من مادّة البيريميتانيل على شكل مركّز معلّق.
يتمتّع ميطـوس® بفعاليّة جيّدة ضدّ التعفّن، الجرب، الألترناريا و عدّة أمراض أخرى.
بعد سنوات من استعمال ميطـوس®، لم يتسبّب في ظهور سلالات فطرية مقاومة.
يمتلك ميطـوس® خصائص بيئيّة و صحيّة مميّزة تمكن من استخدامه ضمن برامج مكافحة مندمجة.

حمـاية أسرع: (بفضل سرعة الإمتصاص و مقاومة الغسل)

الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لميطـوس® تمكنه من سرعة النفاذ داخل الأوراق و ذلك خلال 2 الى 4 ساعات بعد المداواة ممّا يجعله في مأمن من الغسل بمياه الريّ و الأمطار و يعجّل في الوصول الـى موقع الاصابة بالفطر

حمـاية أطول: (بفضل التوزيع الجهازي و الشامل داخل الأوراق)

يتمتع ميطـوس® بإعادة توزيع شاملة داخل الورقة و ذلك بفضل

- سرعة النّفاذ و اعادة التّوزيع داخل الورقة .
- إعادة توزيع بالتّبخّر ممّا يضمن لميطـوس® بلوغ المناطق التي لم يلمسها المحلول
- حركة جهازيّة داخل الورقة.

حمـاية أقـوى: (بفضل الفعاليّة المزدوجة وقائيّة و علاجيّة)

- يعمل ميطـوس® بطريقة وقائيّة و علاجيّة.
- يعيق ميطـوس® تطوّر الفطر و ذلك قبل ظهور أعراض المرض.
- يكوّن ميطـوس® حاجزا يحول دون نفاذ الفطر داخل الورقة.
- يعمل ميطـوس® بطريقة علاجيّة و ذلك بكسر الدّورة الحياتيّة للفطر.

النصائح و الاستعمالات

الزراعة	العنب	طماطم محميّة	الفراولة	التفاح	تفاح للخزن	ثوم، بصل	بطاطا
المرض	التعفّن الرمادي	التعفّن الرمادي	التعفّن الرمادي	الجرب	التعفّن الرمادي البينيسيليوم	تعفّن الأوراق	الألترناريا
الجرعة (مل/هل)	250	250	250	100	250	150	100
فترة الترقب	7	1	1	72	14	7	7

Distributeur en Tunisie

EL MOUSSEM Agricole S.A. الموسم الفلاحي ش.خ.ا

Z.I Mghira 2 Lot N° 54
2082 - Fouchana - Ben Arous - Tunisie
Tél : + 216 79 40 89 40 - Fax : + 216 79 40 88 89
E-mail : information@elmoussem.com

Fournisseur

BAYER Science For A Better Life

Protection plus RAPIDE

Par une absorption rapide et une résistance au lessivage



Les propriétés physico-chimiques du pyrimethanil font que MYTHOS pénétre très rapidement dans les feuilles.
Mythos à une résistance prouvée à la pluie dans les 2-4 h. qui suivent une application

La pénétration rapide, et la mobilité aisée à l'intérieur de la feuille, signifie que Mythos peut atteindre rapidement le site de l'infection fongique.

Protection plus LONGUE

Par une distribution systémique, gazeuse et complète dans la feuille



Schéma des différents types de mouvements de MYTHOS dans un tissu végétal

Le redistribution de MYTHOS est complète dans la feuille grace à sa:
i) Pénétration rapide à l'intérieur de la feuille
ii) Redistribution à l'intérieur de la feuille par un mouvement translaminaire
iii) Mobilité systémique dans la feuille via le xylème
iV)Redistribution en phase gazeuse (vapeur) sur la surface foliaire permettant la couverture des parties non traitées

Protection plus FORTE

Par une double activité préventive et curative, indépendante de la T°



MYTHOS agit de façon préventive et curative.
MYTHOS bloque le développement du champignon avant l'apparition des symptômes sur la feuille.
MYTHOS forme une barrière de sécurité contre l'infection à l'intérieur de la feuille.
MYTHOS agit curativement en inhibant la différentitation des hyphes, bloquant ainsi le cycle de développement du champignon.

MYTHOS est efficace indépendemment de la température. Une propriété intéressante quand les basses températures ne sont pas propices à l'utilisation d'un fongicide anti-Botrytis.

Positionnement sur Botrytis de la vigne

MYTHOS *s'utilise durant toute la période de sensibilité au BOTRYTIS*

MYTHOS

Début floraison - 7 jours avant récolte
250 cc/ hl

- Le nombre de traitement par saison varie selon le programme de traitement contre le Botrytis et le programme de gestion de la résistance
- MYTHOS n'a pas d'effet négatif sur la fermentation du vin.
- MYTHOS n'a aucune influence sur les qualités organoliptiques du vin.

Positionnement sur Botrytis des cultures maraîchères

Période et dose d'application sur tomate sous serre contre BOTRYTIS

MYTHOS

Début floraison - 3 jours avant récolte
250 cc/ hl

Période et dose d'application sur fraisier contre BOTRYTIS

MYTHOS

Boutons blancs/ 30% fleurs ouvertes - 3 jours avant récolte
2,5 L / ha

Positionnement sur tavelure du pommier

MYTHOS *s'utilise durant toute la période de sensibilité à la TAVELURE*

MYTHOS

Pointe verte - Début nouaison
100 cc/ hl

- Mythos possède une excellente action préventive vis-à-vis de la tavelure sur feuille et peut être utilisé curativement jusqu'à 72 heures après l'infection.
- Mythos pénètre au travers de la cuticule cireuse, se déplace à l'intérieur de la feuille, la protégeant ainsi au fur et à mesure de sa croissance.